

CHRONICKÁ SPONTÁNNÍ KOPŘIVKA (CSU)

CSU je forma chronické kopřivky spojená s vysilujícími příznaky svědění.^{1,2}

PŘÍZNAKY^{1-5,7}



SPONTÁNNĚ & OPAKOVANĚ
SE VYSKYTUJÍCÍ



CHRONICKÉ (TRVAJÍCÍ)
NEJMÉNĚ ŠEST TÝDNŮ



ZARUDLÁ
KŮŽE
S OTOKEM



SVĚDĚNÍ



OTOKY V HLUBŠÍCH
VRSTVÁCH KŮŽE
(ANGIOEDÉM)

KOMPLIKACE^{3,7}



SPÁNKOVÁ
DEPRIVACE



DEPRESE



SPOLEČENSKÁ
IZOLACE



ZTRÁTA
ENERGIE



ÚZKOST



EMOCIONÁLNÍ
VÝKYVY

PREVALENCE^{3,4}

V daném okamžiku je až 1% světové populace zasaženo chronickou kopřivkou (CU), z něhož až 2/3 trpi CSU.

Přičemž u žen je toto onemocnění dvakrát častější než u mužů.



PRŮBĚH^{3,6}



Lidé trpící CSU, u kterých se rozvinul angioedém mívají příznaky po delší dobu, než ti, kteří mají pouze CSU. Ve většině případů trvá CSU obvykle 1 až 5 let, ale může trvat i desítky let.

1. Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) website. "Chronic Urticaria (Hives)." <http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=23&cont=328>. Accessed February 2014.

2. American Academy of Allergy Asthma & Immunology (AAAAI) website. "Skin Allergy Overview." <http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/skin-allergy.aspx>. Accessed February 2014.

3. Maure M, Weller K, Bindlev-Jensen C, et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria: A GA2LEN task force report. *Allergy*. 2011;66:317-330.

4. Kulthanan K, Jiamton S, Thumpimukvata N, et al. Chronic idiopathic urticaria: prevalence and clinical course. *J Dermatol*. 2007;34:294-301.

5. Maurer M, Rosén K, Hsieh HJ, et al. Omalizumab for the treatment of chronic idiopathic or spontaneous urticaria. *NEJM*. 2013;368(10):924-935.

6. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ, et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective (position paper). *World Allergy Organ J*. 2012; 5:125-147.

7. O'Donnell BF, Lawlor F, Simpson J, Morgan M, Greaves MW. The impact of chronic urticaria on the quality of life. *Br J Dermatol*. 1997;136(2):197-201.